

Wij wensen uw kind een spoedig herstel!

Met vriendelijke groeten,
het verpleegkundig personeel van de dagenheid kinderen.



EENDAGSCHIRURGIE bij kinderen

Instructies na een
OFTALMOLOGISCHE INGREEP



Universitair Ziekenhuis Brussel

Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
tel: 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be

Uitgave: mei 2012

Verantwoordelijke uitgever: Prof. Dr. Y. Vandenplas, Dr. H. Deconinck



Universitair Ziekenhuis Brussel



kinderziekenhuis
UZ Brussel

Vandaag werd er bij uw kind volgende operatie verricht:

- Strabisme
- Traanwegsondage
- Traanwegintubatie
- Ooglidchirurgie
- Chalazion

Wat betreft deze ingreep zal uw kind weinig hinder ondervinden.

1. NAZORG NA EEN STRABISME OPERATIE

- Ogen reinigen met een steriel compres en fysiologisch serum. Dit zolang er bloed en /of korstjes aanwezig zijn.
- Dagelijks 4 keer 1 druppel Tobradex collyre in beide ogen druppelen.
Duur van de behandeling: tot de volgende controle; de arts beslist dan of er nog verdere zorgen nodig zijn.
- Leg u zelf en uw kind een strikte handhygiëne op.
Vermijd dat uw kind gaat spelen in de zandbak, in het bos...
- Zwemmen is niet toegestaan.
- Een specifieke bescherming is niet nodig, tenzij een zonnebril bij lichtschuwheid.
- In de periode tussen de operatie en de controle-raadpleging moeten er druppels in de ogen gedaan worden. Verdere specifieke instructies worden U bij ontslag door de arts gegeven.
- Na 1 week en nogmaals na 1 maand wordt uw kind ter controle teruggezien op de raadpleging kinder-oogheelkunde.
- Tenzij uitdrukkelijk door de arts gevraagd, dient uw kind zijn/haar bril niet te dragen.

2. NAZORG NA EEN TRAAWEGSONDAGE

- Ogen reinigen met een steriel compres en fysiologisch serum. Dit zolang er bloed en /of korstjes aanwezig zijn.
- Dagelijks 4 keer 1 druppel Tobradex collyre in het gesondeerde oog druppelen.
Duur van de behandeling: 1 week .

3. NAZORG NA CHALAZION OPERATIE

- Doorgaan met hygiëne van het ooglid.
- Gedurende 5 dagen, 2 keer per dag Tobradex zelf aanbrengen in het geopereerde oog.

4. VOLGENDE BEVINDINGEN ZIJN NIET VERONTRUSTEND

- Bloederige tranen.
- Bloedsporen in neus en mond.
- Wrijvend gevoel in het oog / de ogen.
- Wrijvend gevoel bij het inbrengen van oogdruppels.
- Lichtschuwheid.

5. IN GEVAL VAN VOLGENDE PROBLEMEN

- Plotse zwelling en hevige pijnen
- Koorts
- Etterige secreties, ondanks antibiotica druppels

dient u tussen 8.45 u. en 16.50 u. contact op te nemen met de consultatie kinder-oogheelkunde: **02 477 60 62**

Buiten de werkuren contacteert u de spoedgevallendienst:
02 477 51 00

6. PIJNSTILLENDE MIDDELEN

Zie bijgevoegd schema.

