

## BROCHURE D'INFORMATION

### GASTRO-ENTEROLOGIE PEDIATRIQUE

UZ BRUSSEL

## GASTROSCOPIE



Une "gastroskopie" est un examen où le médecin regarde et examine l'oesophage, l'estomac et le début de l'intestin avec un endoscope (un tuyau avec une caméra dont le diamètre est adapté à la taille de l'enfant). En général, cet examen est vécu comme très peu ou non-douloureux, mais très désagréable.

#### Préparation :

En-dessous de 1 an: à jeun depuis 4 heures du matin.

Plus de 1 an: à jeun depuis minuit.

#### L'examen

Un endoscope est introduit par la bouche afin de pouvoir réaliser une gastroskopie. Des biopsies (des tout petits morceaux d'intestin) sont en principe prélevés pendant l'examen. Ces biopsies sont examinées à l'aide d'un microscope après préparation des tissus.

Une prémédication n'est pas donnée à un enfant en-dessous d'un an à cause des risques d'insuffisance respiratoire.

Un sédatif ou anesthésie chez l'enfant plus âgé a surtout pour but de diminuer l'angoisse de votre enfant. Dépendant de l'âge et de l'angoisse de votre enfant, un léger sédatif par voie intraveineuse (= ponction comme prise de sang) ou par voie rectale (= suppositoire) est administré. Les parents et l'enfant peuvent intervenir dans le choix du sédatif.

Les plus grands enfants (>12 ans) n'ont souvent pas besoin d'un sédatif. Dans ce cas, uniquement un spray anesthésiant la gorge est suffisant.

#### Soins après l'examen

Si il n'y pas eu d'administration d'un sédatif, votre enfant peut boire et manger immédiatement après l'examen et peut rentrer. Si un sédatif a été administré, votre enfant doit être bien réveillé avant qu'il puisse boire, manger et rentrer à la maison.

Dans la plupart des cas, l'enfant n'a qu'un souvenir vague de l'examen.

En cas d'administration d'un sédatif dans la gorge, il faut attendre une trentaine de minutes avant que le spray ne fasse plus d'effet.

#### Complications

Le risque pour une perforation gastrique ou intestinale est minimal. Un peu de flatulence et des crampes suite à l'air insufflé est souvent le seul inconvénient.

Dans le cas où un enfant avec un retard-psychomoteur a subi l'examen, il y a un risque minime qu'il éprouve des difficultés respiratoires.

Veillez vous présenter aux **inscriptions** dans l'entrée de l'**Hôpital Pédiatrique** avec la **carte-SIS** de votre enfant.

Vous demandez un **formulaire d'enregistrement** pour la gastro-entérologie pédiatrique et vous vous rendez à l'**unité** qui se trouve au **niveau -1**.

Arrivés à l'unité, vous donnez votre formulaire à une infirmière et vous prenez place dans la salle d'attente.

Puisque la majorité des enfants doit être à jeun, nous vous demandons de ne pas leur donner à manger ni à boire dans la salle d'attente.

Nous vous demandons d'apporter quelque chose à manger et à boire pour votre enfant pour le lui donner après les examens.

Veillez nous contacter immédiatement si vous devez annuler votre rendez-vous ou si vous constatez que vous arriverez en retard.

Tel: 02/4776069

02/4778150

02/4763621

Pour un nouveau rendez-vous :

Tél: 02/4774185

02/4775719

**UZ Brussel****Gastroentérologie pédiatrique**

Prof. Dr. Y. Vandenplas

Dr. B. Hauser

Dr. T. Devreker

Dr. T. Mahler

Prof. G. Veereman

Dr. E. De Greef

**UZ Brussel Kinderziekenhuis**

Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

Pour une consultation gastroentérologie pédiatrique

Tel : 02 477 60 61

Pour un examen en gastroentérologie pédiatrique

Tel : 02 477 41 85