

Nous souhaitons à votre enfant un prompt rétablissement!

Avec nos salutations amicales,
le personnel infirmier de l'unité de jour des enfants.



CHIRURGIE PEDIATRIQUE ambulatoire

Conseils après une
INTERVENTION OPHTALMOLOGIQUE



Universitair Ziekenhuis Brussel

Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
tél: 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be

Edition: mai 2012

Editeur responsable: Prof. Dr. Y. Vandenplas, Dr. H. Deconinck



Universitair Ziekenhuis Brussel



l'hôpital des enfants
de l'UZ Brussel

Aujourd'hui votre enfant a subi l'opération suivante:

- Correction du strabisme
- Sondage d'un canal lacrymal
- Intubation d'un canal lacrymal
- Chirurgie de la paupière
- Chalazion

Cette intervention comporte très peu d'inconvénient pour votre enfant.

1. SOINS POST-OPERATOIRE: STRABISME

- Nettoyer les yeux avec des compresses stériles et du sérum physiologique.
- Mettre 4x par jour 1 goutte de Tobradex collyre dans chaque œil. Ceci jusqu'au premier rendez-vous, à ce moment le médecin ajustera le traitement.
- Nous vous demandons une hygiène stricte. Il faut éviter que votre enfant joue dans un bac à sable, dans le bois...
- La natation n'est pas autorisée.
- Une protection spécifique n'est pas nécessaire, sauf des lunettes de soleil si votre enfant est photophobe.
- Dans la période entre l'opération et le contrôle à la consultation, il faut mettre des collyre dans les yeux. Le chirurgien vous donnera les instructions plus spécifiques, lors de votre départ.
- Après une semaine et après un mois, votre enfant sera revu à la consultation d'ophtalmologie-pédiatrique pour les contrôles.
- Sauf à la demande explicite du médecin, votre enfant ne doit pas mettre ses lunettes.

2. SOINS POST-OPERATOIRE: SONDAGE

- Nettoyer les yeux avec des compresses stériles et du sérum physiologique.
- Mettre 4x par jour 1 goutte de Tobradex collyre dans l'œil opéré. Ceci pendant 1 semaine.

3. SOINS POST-OPERATOIRE: CHALAZION

- Continuer l'hygiène des paupières.
- Mettre 2x par jour du Tobradex onguent dans l'œil opéré pendant 5 jours.

4. IL NE FAUT PAS VOUS INQUIETER EN CAS DE

- Larmes saignantes.
- Trace de sang dans le nez et dans la bouche.
- Sensation de grattement dans l'œil / les yeux.
- Sensation de grattement en mettant le collyre dans l'œil / les yeux.
- Photophobie (gêne à la lumière).

5. EN CAS DE PROBLEMES

- Gonflement subite et douleurs fortes
- Fièvre
- Sécrétions de pus, malgré les gouttes d'antibiotiques

Pendant les heures de la consultation d'ophtalmologie-pédiatrique (entre 8.45 h. et 16.50 h.) vous pouvez toujours prendre contact avec le service: **02 477 60 62**

En dehors de ces heures, contactez plutôt le service d'urgence: **02 477 51 00**

6. ANTIDOULEURS

Voir schéma ci-joint.

