


INFOBROCHURE

KINDERGASTROENTEROLOGIE

UZ BRUSSEL

LINKER COLONOSCOPIE /

RECTOSCOPIE



U komt met uw kind naar de dienst kindergastro voor een "linker colonoscopie" of "rectoscopie".

U meldt zich aan bij **de inschrijvingen** in de inkomhal van het Kinderziekenhuis met de **SIS-kaart** van uw kind.

U vraagt **een formulier voor kindergastro**, daarna komt u naar de eenheid **Kindergastro op Niveau -1**.

U geeft uw formulier af aan een verpleegkundige en neemt plaats in de wachtzaal.

Gezien de meeste kinderen nuchter moeten zijn, vragen wij u met aandrang niet te eten of te drinken in de wachtzaal.

Gelieve voor uw kind eten en drinken mee te brengen, zodat uw kind iets kan eten of drinken na het onderzoek.

Gelieve ons **ALTIJD** en zo snel mogelijk te verwittigen indien u niet of te laat aanwezig zal zijn.

Tel: 02/4776069

02/4778150

02/4763621

Voor een nieuwe afspraak :

Tel : 02/4774185

02/4775719

Een "rectoscopie" of "linker colonoscopie" is een onderzoek waarbij de dokter met een endoscoop (buis/slang met een camera) gaat kijken in de darm via de anus. Afhankelijk van het deel van de darm die de dokter bekijkt, spreekt men van een "rectoscopie" (1^e +/-15cm) of een "linker colonoscopie" (+/- 30-40 cm).

Dit onderzoek is vervelend en geeft soms krampen omdat de dokter lucht moet inblazen om de darm goed te kunnen zien.

Vorbereiding

Een klein lavementje (fleet) wordt thuis gegeven de avond voor het onderzoek.

De dag zelf :

Onder 1 jaar: nuchter vanaf 4 u

Boven 1 jaar: nuchter vanaf 24u

Op de afdeling zal vóór een "rectoscopie" of "linker colonoscopie" nog een lavementje gegeven worden door de verpleegkundige.

Onderzoek zelf

Tijdens een endoscopie worden er ook bipten genomen (dit zijn stukjes darmweefsel -ongeveer speldenkop groot- die via een tangetje genomen worden). Deze bipten worden dan microscopisch onderzocht.

Sedatie of verdooving heeft vooral als doel om de angst van Uw kind weg te nemen; pijnstilling hoeft niet vermist het onderzoek wel "vervelend" is, maar niet "pijnlijk".

Afhankelijk van de leeftijd en de angst van uw kind wordt een lichte sedatie via een intraveneuse perfusie (= prik) of via intrarectale weg (=zoals suppo) toegediend.

Het kind en de ouders hebben inspraak over de vorm van sedatie die toegediend wordt.

Voor een rectoscopie hoeft eigenlijk geen sedatie, want het is niet meer dan "een suppo" steken.

Een kind onder de leeftijd van 1 jaar krijgt geen sedatie.

Oudere kinderen (>10-12 jaar) hebben vaak ook geen sedatie nodig.

Nazorg

Indien er een sedatie geweest is, dient uw kind goed uitgeslapen te zijn alvorens het kan drinken, eten en naar huis kan.

Indien er geen sedatie was kan het kind onmiddellijk eten, drinken en naar huis.

Verwikkelingen

Dit is een zeer veilig onderzoek.

Er is een zeer klein risico op perforatie van de darm.

Wat winderigheid en krampen als gevolg van de ingeblazen lucht is het enige ongemak.