

BROCHURE D'INFORMATION

GASTRO-ENTEROLOGIE PEDIATRIQUE

UZ BRUSSEL

PH - METRIE

IMPEDANCE

pH-métrie, impédance: c'est quoi ?

Aussi bien la pH-métrie que l'impédance sont des examens qui détectent le reflux gastro-oesophagien. Une pH-métrie ne mesure que le reflux acide ; une impédance détecte chaque reflux indépendant du pH.

Préparation

A jeun d'au-moins deux heures avant l'examen. Essayer de demander à votre médecin ou à l'infirmière si la médication que votre enfant prend doit être arrêtée avant l'examen et si cette médication doit être continuée pendant l'examen ou pas.

L'examen lui-même

Une fine sonde sera glissée par le nez dans l'œsophage.

Ceci n'est pas douloureux mais bien désagréable. Avant de mettre la sonde, nous mettons quelques gouttes de Nesivine® dans le nez de votre enfant pour faciliter le passage de la sonde par le nez.

La sonde est connectée à un appareil qui met toutes les données dans une mémoire. Dans le service de radiologie, nous ferons une « fluoroscopie » pour voir si la sonde se trouve à l'endroit voulu. Si nécessaire, nous adaptons la position de la sonde .

La sonde doit rester au-moins 20 heures en place. Les infirmières vous donneront une « feuille d'observation » sur laquelle vous devrez noter toute information intéressante (repas, position, dormir, toux, vomissement, médicaments,..) pour l'interprétation des données enregistrées. Les infirmières vous demanderont aussi d'utiliser le "event-marker" sur l'appareil: c'est un bouton qu'il faut pousser lorsque l'un ou autre de ces événements que vous devez noter sur la feuille se passe.

La précision avec laquelle vous notez ces données (symptômes...) facilitera l'interprétation des données.

Les enfants peuvent être rapides !!

Il est important de bien observer votre enfant pour éviter qu'il déconnecte la sonde de l'appareil ou plus ennuyeux encore, enlève la sonde de son nez. Cet examen peut nécessiter une hospitalisation de 24 heures mais souvent c'est examen se fait en ambulatoire. Dans ce cas, il faudra revenir le lendemain à l'hôpital pour enlever la sonde.

N'oubliez pas d'amener votre feuille d'observation. !

Soins après l'examen

Aucun.

Complications

Une complication n'a jamais été constatée.

Parfois la sonde ne passe pas par le nez.

Veillez vous présenter aux **inscriptions** dans l'entrée de l'**Hôpital Pédiatrique** avec la **carte-SIS** de votre enfant.

Vous demandez un **formulaire d'enregistrement** pour la gastro-entérologie pédiatrique et vous rendez à l'**unité** qui se trouve au **niveau -1**.

Arrivés à l'unité, vous donnez votre formulaire à une infirmière et vous prenez place dans la salle d'attente.

Puisque la majorité des enfants doit être à jeun, nous vous demandons de ne pas leur donner à manger ni à boire dans la salle d'attente.

Nous vous demandons d'apporter quelque chose à manger et à boire pour votre enfant pour le lui donner après les examens.

Veillez nous contacter immédiatement si vous devez annuler votre rendez-vous ou si vous constatez que vous arriverez en retard.

Tel: 02/4776069

02/4778150

02/4763621

Pour un nouveau rendez-vous :

Tel : 02/4774185

02/4775719



Universitair
Kinderziekenhuis
Brussel

UZ Brussel

Gastroëntérologie pédiatrique

Prof. Dr. Y. Vandenplas

Dr. B. Hauser

Dr. T. Devreker

Dr. T. Mahler

Prof. G. Veereman

Dr. E. De Greef

UZ Brussel Kinderziekenhuis

Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

Pour une consultation gastroëntérologie pédiatrique

Tel : 02 477 60 61

Pour un examen en gastroëntérologie pédiatrique

Tel : 02 477 81 50