

Aangezien uw kind binnenkort een onderzoek of een ingreep onder sedatie ondergaat, geven we u enige aanvullende informatie.

Wanneer wordt sedatie toegepast?

- Bij korte ingrepen die geen algemene anesthesie vereisen.
- Om een onderzoek uit te voeren (MR, CT-scan, BERA) waarbij het kind een langere tijd niet mag bewegen.

Wat is sedatie?

Om een patiënt onder sedatie te brengen worden licht verdovende geneesmiddelen toegediend die het bewustzijn verminderen en die de patiënt in een diepe slaap brengen.

Sedatie is geen totale anesthesie, want de patiënt is niet volledig bewusteloos en de sensibiliteit wordt niet totaal opgeheven.

Een belangrijk voordeel voor de patiënt is dat dat preoperatieve onderzoeken overbodig zijn.

Welke voorbereidingen moet uw kind krijgen?

- Kinderen ouder dan 1 jaar moeten nuchter blijven vanaf middernacht. Kinderen jonger dan 1 jaar mogen tot 6 uur 's morgens eten.
- Kinderen die een behandeling volgen met anti-epileptica (Luminal®, Depakine®...) of die Hydrocortisone nemen, mogen hun medicatie de ochtend van de sedatie innemen met een slokje water.
- Uw kind mag geen koorts hebben en niet verkouden zijn. Een verstopte neus of hoestbuien kunnen een indicatie zijn om de sedatie uit te stellen.
- Het is belangrijk dat u zo veel mogelijk bij uw kind kan blijven, ook gedurende de verzorging en tijdens eventuele onderzoeken. Meer dan twee personen tegelijk kunnen we echter niet in de kamer toelaten.
- Als uw kind thuis een cardio-respiratoire monitor heeft, brengt u dit toestel mee naar het ziekenhuis.
- Indien een MR onderzoek gepland is mag uw kind geen enkel metalen voorwerp bij zich hebben en ook geen kledij dragen waarin metaal is verwerkt (drukknoppen, ritsen, (haar)speldjes, gespen, ...).

Hoe wordt uw kind onder sedatie gebracht?

- Bij aankomst op de dagenheid wordt uw kind gewogen om de dosis sederende medicatie te berekenen.
- De verpleegkundige komt langs om een paar vragen te stellen en om de temperatuur van uw kind te nemen.
- De kinderarts komt uw kind nog onderzoeken en overloopt eventueel recent doorgemaakte ziektes en/of medicatiegebruik.

- Aangezien uw kind de rest van de ochtend nuchter moet blijven, plaatsen we een infuus dat toelaat om medicijnen en/of contrastmiddel via de bloedbaan toe te dienen.
- Aan kinderen jonger dan 1 jaar, wordt een half uur vóór het onderzoek of ingreep een sederende siroop toegediend. Omdat dit product de slokdarm kan irriteren wordt het via een fijne maagsonde rechtstreeks in de maag toegediend.
- Kinderen die ouder zijn dan 1 jaar krijgen bij aankomst op de dagenheid een licht sederende zetpil (suppo). Dit zal uw kind vooral rustig houden, soms treden tijdelijk wat evenwichtsstoornissen op als nevenwerking. Een half uur vóór het onderzoek of ingreep geven we uw kind een diepere sedatie waardoor het rustig in slaap valt. Deze medicatie wordt toegediend via een inspuiting in de bil.

Wat gebeurt er na de sedatie?

De tijd die uw kind na het onderzoek of ingreep nodig heeft om wakker te worden is niet op voorhand te voorspellen maar u kunt helpen door uw kind zacht te stimuleren.

Voor het naar huis kan moet uw kind, in functie van de leeftijd, zelfstandig op zijn voetjes kunnen staan, gedronken en gegeten hebben:

- Voor zuigelingen is dit minstens een flesje melk (de flesvoeding meebrengen aub).
- Grotere kinderen krijgen op de afdeling een gesuikerde drank (een sapje of een cola) en een broodjesmaaltijd.

Het ontslag kan pas plaatsvinden vanaf het moment dat uw kind goed wakker is en nadat de pediater er goedkeuring voor heeft gegeven.

Waar moet u thuis op letten?

Het kind zal in de loop van de namiddag opnieuw in slaap vallen. Dit is normaal, maar probeer uw kind op regelmatige tijdstippen te wekken en eten en drinken te geven.

Zorg ervoor dat uw kind, vóór het de nachtrust aanvat, een volledige maaltijd gegeten heeft.

Sommige kinderen kunnen 's namiddags nog last hebben van evenwichtsstoornissen.

Welke problemen kunnen zich thuis voordoen?

- Uw kind is niet wakker
- Wil niet eten of drinken
- Voelt zich misselijk of braakt
- Gedraagt zich abnormaal

Aarzel niet om bij één van deze problemen contact op te nemen met

- uw huisarts
- de dageenheid kinderen tel: 02 477 60 67
(tijdens de werkuren)
- de spoedgevallendienst tel: 02 477 51 00

Neem steeds de brief mee die u ontvangen hebt bij het ontslag. Deze brief vermeldt namelijk welke medicatie uw kind kreeg toegediend.

Deze folder is indicatief en geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen, risico's zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt afzonderlijk, wordt door de arts verstrekt. Volledige of gedeeltelijke overname van de tekst is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Universitair Ziekenhuis Brussel
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
tel: 02 477 41 11 - www.uzbrussel.be - info@uzbrussel.be

Verleende haar medewerking aan deze brochure:
Mevrouw N. Stijlemans, hoofdverpleegkundige
Uitgave: september 2009
Verantwoordelijke uitgever: Prof. dr. Y. Vandenplas



KINDERZIEKENHUIS - DAGEENHEID

DE SEDATIE



Universitair Ziekenhuis Brussel



Dageenheid Kinderen
02 477 60 67