

Bijkomende maatregelen:

- Draag geen juwelen en make-up.
- Knip uw nagels kort.
- Neem indien mogelijk een douche.
- Ververs indien mogelijk dagelijks uw bedlinnen en nachtkledij.

Belangrijk: Onderbreek de behandeling niet.

We wensen u een goed herstel toe.



INFORMATIE voor de patiënt

Opsporen van *Staphylococcus aureus*

Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt afzonderlijk, wordt door de arts verstrekt. Overname van de tekst is niet toegestaan.
Voor reacties op deze brochure: Annie.vandenbroeck@uzbrussel.be

UZ Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
tel: 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be

Uitgave: maart 2016:
Verantwoordelijke uitgever: Prof. dr. M. Noppen

Mevrouw, Mijnheer,

De kans bestaat dat u, zoals velen, drager bent van de *Staphylococcus aureus* (S.aureus) bacterie. Deze bacterie zit bij veel mensen op de huid en in de neus en geeft meestal geen problemen.

Na een operatie kan de bacterie echter wel ernstige infecties veroorzaken. Daarom nemen we bij patiënten altijd een staaltje van de keel en het neusslijmvlies als ze:

- een prothese krijgen voor de vervanging van een gewricht (bv. een knie- of heupprothese),
- geopereerd worden aan het hart en/of de grote bloedvaten (bv. klep of overbrugging).

Met een wattenstokje wrijven we kort in de keel en in de neus en onderzoeken in het labo of er bacteriën aanwezig zijn (screening).



Universitair Ziekenhuis Brussel

Als blijkt dat u drager bent van *Staphylococcus aureus*, krijgt u vóór de ingreep een preventieve behandeling.

Als het resultaat van de screening niet tijdig gekend is, gaat de ingreep door zoals gepland en starten we toch uit voorzorg dezelfde behandeling.

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling duurt 5 dagen en bestaat uit het gebruik van neuszalf, een keelspray en u moet zich wassen met een ontsmettende lotion.

1. BACTROBAN® neuszalf: 3x/dag

	Breng de neuszalf (ter grootte van een luciferknop) aan op uw pink. Breng ze aan in het voorste deel van uw neus.
	Herhaal dit voor het andere neusgat.
	Druk uw neus dicht zodat de zalf zich in uw neus kan verspreiden. Was nadien uw handen!

dag	datum	Plaats een vinkje na elke behandeling <input checked="" type="checkbox"/>		
1/...../.....	8 uur	12 uur	20 uur
2/...../.....	8 uur	12 uur	20 uur
3/...../.....	8 uur	12 uur	20 uur
4/...../.....	8 uur	12 uur	20 uur
5/...../.....	8 uur	12 uur	20 uur

2. CORSODYL® keelspray: 2x/dag

Spuit met de spray achteraan in uw keel. Vermijd contact met de ogen! Deze keelspray heeft geen (gekende) bijwerkingen.

3. STELLISEPT® MED waslotion: 1x/dag

Gezicht en haren

Was aangezicht, vermijd contact met ogen en oren (ogen gesloten houden). Was uw haar op dag 1 en dag 5.

Bovenlichaam


Was het bovenlichaam.

Intiem toilet

Was de genitale delen en de bilnaad.

Benen en voeten

Was benen en voeten, vergeet de ruimte tussen uw tenen niet.



Spoelen en drogen

Respecteer de contacttijd van 30 seconden. Spoel grondig na en droog u goed af, van boven naar onder.

Algemene opmerkingen:

- De waslotion vervangt uw 'normale' zeep. De lotion schuimt niet, werkt desinfecterend en heeft geen (gekende) bijwerkingen.
- Giet de waslotion onverdund op een vochtig washandje of breng aan met uw handen.
- Geef extra aandacht aan de huidplooien zoals oksels, liezen, navel, bilnaad, tussen uw tenen.
 - Zorg bij het afspoelen en afdrogen dat er geen resten lotion achterblijven.
 - Gebruik dagelijks verse handdoeken en washandjes.