

PAXLOVID® patiëntenbrochure

Preventie van een ernstige infectie met SARS-CoV-2 (COVID-19)

WAT BETEKENT HET EN WANNEER SCHRIJFT DE ARTS DIT VOOR?

SARS-CoV-2 is het virus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Het nestelt zich voornamelijk in de luchtwegen, waardoor ernstige ademhalingsklachten kunnen ontstaan. Bij patiënten met een verhoogd risico op ernstige COVID-19 kan Paxlovid® gebruikt worden. Dit geneesmiddel vermindert de kans op een ziekenhuisopname door de vermenigvuldiging van het virus in het lichaam te remmen.


DOELTREFFENDHEID

Om de meeste kans op succes te hebben moet Paxlovid® zo snel mogelijk na de diagnose en binnen 5 dagen na het begin van de symptomen worden toegediend.

DE BEHANDELING

Paxlovid® mag alleen voorgeschreven worden door gespecialiseerde artsen die patiënten behandelen met een kwetsbaar immuunsysteem als gevolg van een ziekte of behandeling. Er zijn 2 bestanddelen, nirmatrelvir en ritonavir. Nirmatrelvir (roze tablet, PF-07321332) blokkeert de vermenigvuldiging van het virus. Ritonavir (witte tablet) zorgt ervoor dat nirmatrelvir langer kan werken.

Beide bestanddelen, die als afzonderlijke tabletten in de doos zitten, moeten samen worden ingenomen. Een correcte inname is belangrijk om de werkzaamheid te garanderen.



Uw huisapotheker bestelt Paxlovid®. De arts bezorgt u hiervoor een elektronisch voorschrift. Meer informatie kan de apotheker vinden op <https://kce.fgov.be/nl/paxlovid-nirmatrelvirritonavir>. Bestellingen, vóór 14u geplaatst, worden sneller geleverd.

Wijze van inname*:

(1 of) 2 tabletten nirmatrelvir + 1 tablet ritonavir
2x/dag, MET of ZONDER voedsel,
gedurende 5 dagen

Het aantal tabletten nirmatrelvir (PF-07321332) is afhankelijk van uw nierfunctie. Eén van volgende schema's wordt voorgeschreven:

□ Standaardschema:

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Tijdstip 0 (vb. 8u)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖
12 uur later (vb. 20u)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖
⊖ = 150 mg nirmatrelvir		⊖ = 100 mg ritonavir			

□ Aangepast schema:

	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
Tijdstip 0 (vb. 8u)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖
12 uur later (vb. 20u)	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖	⊖ ⊖

Waarschuwingen:


- Slik de tabletten in hun geheel in, met een glas water. De tabletten niet kauwen, breken of pletten.
- Neem geen dubbele dosis in. Als u vaststelt dat u een inname vergeten bent:
 - o binnen de 8 uur na het normale tijdstip: neem de tabletten alsnog in
 - o langer dan 8 uur na het normale tijdstip: sla de inname over en wacht op het volgende inname-tijdstip
- Als u de aangepaste dosis voor een verminderde nierfunctie voorgeschreven kreeg, wordt gevraagd de resterende tabletten nirmatrelvir terug te brengen naar de apotheek na afloop van de behandeling.
- Ook als uw klachten verergeren, wordt aanbevolen de volledige 5-daagse kuur af te maken. Zou een opname toch nodig blijken, neem uw medicatie mee naar het ziekenhuis.
- Deze behandeling wordt niet aanbevolen bij kinderen, vruchtbare vrouwen die geen anticonceptie nemen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

BIJWERKINGEN

Mogelijke bijwerkingen zijn: veranderde smaak, misselijkheid, braken, diarree. Deze bijwerkingen zijn niet ongewoon en vormen geen directe reden tot ongerustheid of stoppen van de behandeling.

THUISMEDICATIE

Het is belangrijk alle andere medicatie die u neemt te vermelden: de voorschrijvende arts kijkt na of Paxlovid® hiermee kan gecombineerd worden. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van deze behandeling en uw thuismedicatie eventueel aanpassen. Indien u hier verder nog vragen over heeft, dan kunnen uw huisapotheker en huisarts u hierbij verder helpen.



PAXLOVID® information pour le patient

Prévention d'infection grave
par le SARS-CoV-2 (COVID-19)

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ET QUAND LE MEDECIN PRESCRIT-IL PAXLOVID®?


Le SARS-CoV-2 (Coronavirus 2) est le virus à l'origine de la maladie COVID-19. Le virus s'installe principalement au niveau des voies respiratoires, provoquant une détresse respiratoire sévère. Les patients présentant un risque de COVID-19 grave peuvent se voir prescrire un médicament antiviral, le Paxlovid®, qui réduit le risque d'hospitalisation en inhibant la multiplication du virus dans le corps.

EFFICACITE

Paxlovid® doit être administré le plus tôt possible après le diagnostic et dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes pour avoir les meilleures chances de réussite.

LE TRAITEMENT

Paxlovid® ne doit être prescrit que par des médecins spécialisés qui traitent des patients dont le système immunitaire est fragile à la suite d'une maladie ou d'un traitement. Il se compose de 2 substances, le nirmatrelvir et le ritonavir. Le nirmatrelvir (comprimé rose, PF-07321332) bloque la multiplication du virus. Le ritonavir (comprimé blanc) permet au nirmatrelvir de rester actif plus longtemps ainsi que le traitement sera plus efficace. Les deux substances, qui se présentent sous forme de comprimés séparés dans la boîte, doivent être pris ensemble. Une prise correcte est importante pour garantir l'efficacité.



Le Paxlovid® est commandé par le pharmacien à domicile. Il peut trouver plus d'information sur le site <https://kce.fgov.be/nl/paxlovid-nirmatrelvirritonavir>. Les commandes passées avant 14 heures sont livrées plus rapidement.

Mode de prise :

(1 ou) 2 comprimés de nirmatrelvir + 1 comprimé de ritonavir, 2x/jour, AVEC ou SANS de la nourriture, pendant 5 jours

Le nombre de comprimés de nirmatrelvir dépendra de votre fonction rénale. On vous prescrira l'un des régimes suivants:

□ Plan de prises **normal** :

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Heure 0 (p.ex. 8h)					
12 heures plus tard (p.ex. 20h)					
= 150 mg nirmatrelvir		= 100 mg ritonavir			

□ Plan de prises **ajusté** :

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
Heure 0 (p.ex. 8h)					
12 heures plus tard (p.ex. 20h)					

Attention:

- Avalez les comprimés entiers avec un verre d'eau. Ne pas mâcher, casser ou écraser les comprimés.
- Si vous constatez que vous avez oublié de prendre le médicament ne prenez jamais une double dose à la prochaine prise. Si vous constatez l'oubli
 - o dans les 8 heures qui suivent l'heure normale: prenez les comprimés oubliés normalement.
 - o avec plus que 8 heures de retard: prenez la dose normale comme prévu à la prochaine prise.
- Même si vos symptômes s'aggravent, il est recommandé de suivre le cours complet de 5 jours. Emportez vos médicaments à l'hôpital si vous devez être admis.
- Si la dose ajustée vous a été prescrite en cas de fonction rénale réduite, il vous sera demandé de retourner les comprimés de nirmatrelvir restants à la pharmacie à la fin du traitement.
- Ce traitement n'est pas recommandé chez les enfants, les femmes fertiles qui ne prennent pas de contraception, les femmes enceintes ou allaitantes.

EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires qui peuvent survenir sont: altération du goût, nausées, vomissements, diarrhée. Ces effets secondaires ne sont pas rares et ne constituent pas une raison immédiate de s'inquiéter ou d'interrompre le traitement.

MEDICAMENTS A DOMICILE

Il est important de mentionner tout autre médicament que vous prenez: le médecin prescripteur verra alors si Paxlovid® peut être associé à celui-ci. Votre médecin sera informé de ce traitement et adaptera votre traitement à domicile si nécessaire. Si vous avez d'autres questions, votre pharmacien de référence et votre médecin généraliste peuvent vous aider.