



INFORMATIE voor de patiënt

De poortkatheter



Universitair
Ziekenhuis
Brussel

Dienst Oncologie © 02 477 77 32
(24u op 24u)
oncologischcentrum@uzbrussel.be

Waarom stelt uw arts een poortkatheter voor?

U moet voor uw behandeling herhaaldelijk geneesmiddelen krijgen via het bloed. De meeste van deze geneesmiddelen zijn te irriterend om toe te dienen in de bloedvaten van uw armen. Met een poortkatheter kunnen we de medicatie in een groter bloedvat toedienen en langs de poortkatheter kunnen we ook bloedafnames doen.




Wat is een poortkatheter?

De poortkatheter is een totaal implanteerbaar toedieningssysteem dat volledig onderhuids wordt geplaatst, iets lager dan het sleutelbeen thv de borstkas.

De poortkatheter bestaat uit 2 delen:

1. Het reservoir of de injectiekamer, met een silicone septum in het midden waarin de naald geprikt wordt.



2. De katheter die aan de injectiekamer is bevestigd en die in een groot bloedvat gebracht wordt.

De plaatsing van een poortkatheter

Een poortkatheter wordt in de operatiezaal onder strikt steriele omstandigheden geplaatst, meestal onder lokale verdoving. Soms is een totale verdoving aangewezen. De ingreep duurt ongeveer een uur.

Verwittig uw arts tijdig als u antistollingsmedicatie inneemt. Deze kan tijdelijk gestopt of overgeschakeld worden. Uw arts zal u ook zeggen of u nuchter moet zijn.

Ter hoogte van de borstkas, net onder het sleutelbeen, wordt een kleine insnede gemaakt van 4 à 5 cm. Het reservoir wordt onder de huid geschoven en de katheter wordt in het bloedvat geplaatst en opgeschoven tot net boven het hart. De wonde wordt daarna met verteerbare draad gehecht.

Na de plaatsing

Uw arts beslist of u dezelfde of de volgende dag naar huis mag. De eerste dagen na de plaatsing kan de wonde en het gebied hals/schouder wat pijnlijk zijn.

U mag hiervoor een pijnstiller nemen op basis van paracetamol. Voor pijnstillers op basis van acetylsalicylzuur (type Aspegic®) en niet-steroidale geneesmiddelen (type Apranax®, Brufen® e.a.) moet u eerst het advies van uw arts vragen.


De hechtingen vergaan spontaan. Soms blijven wat knoepjes over die eenvoudig kunnen verwijderd worden.

Indien de poortkatheter oppervlakkig geplaatst is, zal er een kleine verhevenheid van de huid merkbaar zijn.

De eerste 48 uur mag u uw arm zeker niet te hoog opheffen. Vermijd ook bruske bewegingen de eerste weken na de ingreep en hef zeker geen zware gewichten op.

Gebruik van de poortkatheter

De poortkatheter kan onmiddellijk na de plaatsing gebruikt worden. Het aanprikken gebeurt met een speciale naald (Hüberpuntnaald). Dit is een naald die alleen gebruikt wordt voor het aanprikken van poortkatheters en die vermijdt dat het septum beschadigd wordt door het veelvoudig aanprikken.



De lengte van de Hüberpuntnaald verschilt van patiënt tot patiënt. De verpleegkundige die uw poortkatheter de eerste keer aanprikkt, zal u zeggen wat de lengte van de naald is. We raden aan dat u deze lengte noteert of onthoudt en dit iedere keer vermeldt als u moet aangeprikt worden.

Het aanprikken van de poortkatheter en aansluiten van de Hüberpuntnaald moet strikt steriel gebeuren om infecties van de poortkatheter te voorkomen.

De naald wordt op de dag van de behandeling geplaatst. Als uw behandeling over meerdere dagen loopt, blijft de naald ter plaatse zodat we niet dagelijks moeten herprikken.

Om verstoppingen en infecties te voorkomen wordt een naald wel vervangen na 7 dagen.

Als de naald verwijderd wordt, moet de poortkatheter gespoeld worden met een fysiologische oplossing en ontsmettend product ter preventie van infecties en verstopping.

Onderhoud van de poortkatheter

Bij het verwijderen van de Hübernaald en indien uw poortkatheter tijdelijk niet gebruikt wordt, moet deze om de 8 weken gespoeld worden om verstoppingen te voorkomen.

Als de poortkatheter niet meer gebruikt wordt kan deze in overleg met de arts verwijderd worden.

Belangrijke weetjes

- Als uw poortkatheter wordt aangeprikt draagt u best bovenkleding die los zit en makkelijk open gaat, zodat de plaats van aanprikken goed zichtbaar en bereikbaar is.
- Het afnemen van bloed via de poortkatheter lukt soms minder goed of niet en dan moeten we toch de bloedafname via uw arm doen.
- Een poortkatheter mag gebruikt worden om contrastproduct toe te dienen bvb. op de dienst nucleaire geneeskunde of radiologie.
- De poortkatheter zal uw dagelijkse activiteiten niet belemmeren.
- Een poortkatheter is geen reden om geen autogordel te dragen.
- Met een Hübernaald mag u geen bad of douche nemen omwille van het risico op infectie.

Wanneer moet u met ons contact opnemen?

- Bij koorts boven 38°C na de plaatsing van de poortkatheter.
- Bij koorts en/of rillingen na het aanprikken of spoelen van de poortkatheter.
- Als uw arm en/of uw hals aan de kant van de poortkatheter pijnlijk of gezwollen aanvoelt.
- Als er roodheid en/of pijn optreedt ter hoogte van de poortkatheter.
- Als er vocht en/of etter uit de prikplaats van de poortkatheter loopt.

Identificatiekaartje

Bij de plaatsing van uw poortkatheter krijgt u een identificatiekaartje met hierop uw identificatiegegevens. Bewaar dit kaartje bij uw identiteitskaart voor het geval er bij een veiligheidscontrole (bv. in de luchthaven) een alarm zou afgaan.

Uw vragen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van
Gerrit Ponnet, Hoofdverpleegkundige Oncologie
Laura Callebaut, Verpleegkundige Oncologie

Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen en risico's zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt. Overname van tekst en illustraties vereist de voorafgaandelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.
Voor reacties op deze brochure: patientinformatie@uzbrussel.be

Universitair Ziekenhuis Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101 - 1090 Jette
tel: 02 02 477 41 11
info@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be

Uitgave: april 2019
Verantwoordelijke uitgever: Prof. dr. M. Noppen