



Chirurgie pédiatrique ambulatoire

Conseils après une intervention ophtalmologique

Votre enfant vient de subir une opération mineure des yeux. Une légère gêne au cours des jours suivants est possible et n'est pas inquiétante. Vous trouvez ci-dessous nos directives générales pour le suivi à domicile.

Si nécessaire :

- Le médecin changera ce traitement. Ses directives ont toujours la priorité.
- Le médecin prescrira des analgésiques en supplément.

☐ Soins post-opératoires : STRABISME

- Nettoyez les yeux avec des compresses stériles et de l'eau du robinet. Répétez tant qu'il reste du sang et/ou des croûtes. Les yeux ne doivent pas être recouverts d'un pansement.
- Mettez 2x par jour 1 goutte de Tobradex collyre dans chaque œil.
- Les enfants qui portent des lunettes, continueront à les porter après l'opération.
- Des lunettes de soleil sont recommandées si votre enfant souffre de lumière (intense).
- Ne laissez pas jouer votre enfant dans le sable, la forêt, les environnements poussiéreux, ... pour éviter la poussière ou un corps étranger dans ses yeux.
- La natation est interdite.
- Nous exigeons de vous et de votre enfant une hygiène stricte des mains.
- Suivez ces directives pendant **1 semaine**, jusqu'au premier contrôle à la consultation d'ophtalmologie-pédiatrique. Le médecin décidera à ce moment si un traitement supplémentaire est nécessaire.
- Après un mois, votre enfant sera revu pour un deuxième contrôle.

☐ Soins post-opérateurs : **SONDAGE DU CANAL LACRYMAL**

- Nettoyez les yeux avec des compresses stériles et de l'eau du robinet. Répétez tant qu'il reste du sang et/ou des croûtes.
- Mettez 2 x/jour 1 goutte de Tobradex collyre dans l'œil opéré. Continuez pendant 1 semaine.

☐ Soins post-opérateurs : **CHALAZION**

- Hygiène des paupières comme avant l'intervention.
- Appliquez 2x/jour la pommade Tobrex dans l'œil opéré, continuez pendant 5 jours.

☐ **INTUBATION D'UNE VOIE LACRYMALE/CHIRURGIE DES PAUPIERES**

Pas de soins post-opérateurs.

Des symptômes non inquiétants :

- des larmes sanglantes,
- des traces de sang dans le nez et dans la bouche,
- sensation de grattage dans l'œil / les yeux,
- sensation de grattage en mettant le collyre dans l'œil / les yeux,
- photophobie (gêne à la lumière).

À considérer comme symptômes graves :

- gonflement subite,
- douleurs fortes,
- fièvre,
- sécrétions de pus, malgré les gouttes d'antibiotiques.

En cas de problèmes, contactez :

- La consultation d'ophtalmologie-pédiatrique: ☎ 02 477 60 62
Les jours ouvrables, entre 8h45 et 16h50
- Le service d'urgence: ☎ 02 477 51 00
24/24h (consultation fermée ou pour une aide urgente)