



Een maagledigingstest is een eenvoudig onderzoek om vast te stellen of uw kind een trage maaglediging heeft.

VOORBEREIDING THUIS

4u nuchter voor kinderen minder dan 1 jaar

12u nuchter voor kinderen vanaf 1 jaar

48–72 uur voor de test onderstaande voedingsregels volgen :

Vermijden
Rietsuiker
Mais en maïsproducten
Ananas
Kiwi

Prokinetica en antidepressiva 3 dagen voor de test te stoppen (tenzij expliciet anders aangegeven door de arts)

Thuismedicatie wordt in overleg met de arts wel of niet gegeven. Gelieve de planningsdienst te verwittigen bij gekende allergie aan melk, soja, ei, lactose, ...

Wat brengt u mee?

Kids-ID of ISI+-kaart van uw kind

Voorzie in geval van een gekende allergie, de aangepaste voeding. Indien uw kind nog flesvoeding neemt, gelieve een leeg flesje mee te nemen.

Een flesje of kleine snack en een drankje zodat uw kind na het onderzoek iets kan eten of drinken. Voorzie voldoende speelgoed/materiaal om het kind gedurende 3 uren rustig bezig te houden (boek, gezelschapsspel, ...)

U BIJDT ZICH AAN IN HET KIDZ HEALTH CASTLE

U zorgt best dat u een kwartier voor de afspraak aanwezig bent in het KidZ Health Castle.

Door plaatsgebrek op de afdeling vragen we met aandrang het kind te vergezellen met slechts één ouder of begeleider en zonder broers en/of zussen.

U bent te laat of u kan niet komen?

Verwittig de dienst Gastro KidZ áltijd en zo snel mogelijk.

Indien u te laat komt, kunnen wij niet verzekeren dat al de geplande onderzoeken kunnen doorgaan.

Indien u niet komt opdagen zal er een administratieve kost worden aangerekend.

Inschrijven

Schrijf uw kind eerst in. Dit kan aan de balie, nadat u aan de ticketkiosk een ticket heeft genomen. De balie vindt u in de inkomhal van het KidZ Health Castle (zone F/route 990). U krijgt na het inschrijven een aanmeldingsformulier.

Volg het routenummer 940 om naar de eenheid **Gastro KidZ/F940** te wandelen.

Aanmelden

Geef uw formulier af aan een verpleegkundige of plaats het in het voorziene bakje en neem plaats in de wachtzaal.

De meeste kinderen moeten nuchter zijn. Wij vragen u nadrukkelijk niet te eten of te drinken in de wachtzaal.

HET ONDERZOEK

De theorie

Met een maagledigingstest kan de arts de tijd meten die de maag nodig heeft om vloeibaar voedsel te verwerken. Dit onderzoek geeft een beeld van de snelheid waarmee de maag vloeistoffen transporteert naar de twaalfvingerige darm. Zo kan de arts een vertraagde maaglediging (luie maag) vaststellen.

De praktijk

Afhankelijk van de mogelijkheden van het kind, ademt het nuchter in een mondstukje of een masker. De uitgeademde lucht wordt opgevangen in een zakje.

De baby krijgt een flesje melk te drinken. Fles met speen meebrengen van thuis ! Hiervoor wordt het "gewoonlijke" thuisvolume gebruikt.

Men voegt hierbij acetaat ifv het gewicht van het kind Het vooropgestelde volume moet dus zeker opgedronken worden.

Voor de "grotere" kinderen wordt acetaat in 200 ml aardbeienmelk opgelost. Zij moeten dit zo snel mogelijk leegdrinken.


Na inname van de vloeistof moet het kind weer nuchter blijven tot het einde van het onderzoek !!

Nadien moet het kind de eerste 40 minuten om de 5 minuten blazen, om vervolgens om de 10 minuten te blazen gedurende nog 2 uren en 20 minuten. In totaal duurt het onderzoek dus tot drie uur na het drinken van de vloeistof. Gedurende die 3 uren moet het kind zo rustig mogelijk blijven. Het liefst ligt het kind in bed en leest het een boekje, kijkt het televisie, ...

Fysieke activiteit is dus niet toegestaan! Om goede resultaten te bekomen wordt dan ook toezicht door de ouders gevraagd.

NA HET ONDERZOEK

Er is geen nazorg nodig.



Kindergastro-enterologie

Prof. B. Hauser
Prof. E. De Greef
Prof. K. Huysentruyt
Prof. G. Veereman
Prof Y. Vandenplas
Dr. T. Devreker
Dr. R. Lemmens
Dr. A. Lemmens

Consultatie ☎ 02 477 60 61 Afspraak onderzoeken ☎ 02 477 41 85 (enkel met een verwijsbrief van uw behandelende arts) Gastro KidZ/F940 ☎ 02 477 70 94 ✉ Gastrokids@uzbrussel.be	Editie: 2023 V.U.: Prof. dr. M. Noppen
Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen en risico's zijn erin opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt.	